

BioIn Act

FITOFORTIFICANTE

Migliora la salute delle piante

Apporta un notevole contenuto di estratti vegetali con la tecnologia **PLANTEX SC®**

Sostiene inducendo il naturale sistema di difesa della pianta

Presenta un'elevata capacità filmante grazie alla tecnologia **ACTIVE-SET®**



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it



BioIn Act

Caratteristiche

BioIn Act è l'innovativo attivatore liquido che agisce in sinergia potenziando gli effetti del BioIn Mz. **BioIn Act** è un nuovo concime pensato per aumentare ulteriormente e i meccanismi di difesa endogeni della pianta grazie agli ulteriori estratti vegetali in esso contenuti, con la tecnologia **PLANTEX SC®**, all'olio di soia e al suo elevato contenuto di acidi grassi poli-insaturi. Tra gli altri effetti, migliora l'azione antitraspirante e filmante, riduce la perdita d'acqua dai tessuti vegetali, migliora la bagnatura della vegetazione e riduce attività e movimento di insetti a corpo molle, nei quali provoca disidratazione. La sua formulazione innovativa garantisce, inoltre, un'elevata capacità di adesione e distribuzione sulle superfici trattate grazie alla tecnologia **ACTIVE-SET®**.

Composizione

Oli vegetali (olio di soia)	100,0%
-----------------------------	--------

Dosi e Istruzioni per l'Uso

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSI ml/hl*
Orticole	Durante l'intero ciclo di crescita evitando durante la fioritura	200
Arboree	Durante l'intero ciclo di crescita evitando durante la fioritura	200
Cereali	Dopo la fase di levata	200
Ornamentali	Durante l'intero ciclo di crescita evitando durante la fioritura	200

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.


Formulazione	Packaging	Densità (T=20°C)	pH (sol. 6 %)	Conducibilità (sol. 10 %)
Liquido solubile	1-5-10-20 l	~ 980 kg/m³	~ 6,4	~ 0,1 dS/m

Avvertenze

Non superare la dose massima consigliata di 2 L/ha per trattamento. Si consiglia di testare il prodotto su piccoli areali e su un numero limitato di piante adattando i dosaggi in caso di sensibilità/fitotossicità. Non usare in miscela con oli minerali e distanziare eventuali trattamenti con essi dall'applicazione del prodotto. Non applicare il prodotto in prossimità della fase di raccolta e in fase di fioritura. Se necessario è possibile ripetere l'applicazione. Non utilizzare in presenza di elevate temperature (T > 30° C) e in caso di forte esposizione solare.

Sono state riscontrate applicazioni ottimali aggiungendo 50 ml/hl di BioIn MZ con 200 ml/hl di BioIn Act.

Specifiche Tecniche



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it