

Fruit Colour

BIOATTIVATORE

Che migliora la qualità dei frutti e la resa finale

Migliora le caratteristiche qualitative del frutto come °Brix, colorazione e consistenza

Aumenta la produzione finale

Potenzia l'efficienza fotosintetica e favorisce lo sviluppo riproduttivo



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

Fruit Colour

Caratteristiche



Fruit Colour è un bioattivatore a base di fosforo (P) e potassio (K), formulato per ottimizzare la nutrizione fosfo-potassica con pH acido, che favorisce una maggiore e rapida assimilabilità, e per stimolare l'attività metabolica delle colture. Il prodotto supporta i principali processi fisiologici, favorendo lo sviluppo riproduttivo e il miglioramento della qualità dei frutti. Il fosforo è fondamentale nei processi energetici cellulari (ATP, NADPH), favorisce la differenziazione florale, regola il bilancio ormonale e risulta particolarmente utile nelle fasi iniziali del ciclo colturale e in pre-fioritura. Il potassio stimola la sintesi di zuccheri, amidi e pigmenti, ed è essenziale per la traslocazione dei foto assimilati e per i processi legati alla maturazione del frutto. **Fruit Colour** migliora l'assorbimento e la traslocazione dei nutrienti, stimola la fotosintesi, la sintesi di fitormoni e amminoacidi, aumentando l'efficienza della fioritura e dell'allegagione. Questo si traduce in un incremento della quantità e della qualità della produzione, con frutti caratterizzati da un più elevato contenuto zuccherino (°Brix), maggiore omogeneità, colorazione intensa, consistenza e una migliorata shelf-life.

Composizione

Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua

6,0%

Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua

56,0%

Dosi e Istruzioni per l'Uso

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSI kg/ha*
Arboree	Dall' ingrossamento del frutto fino a maturazione (2-3 applicazioni)	2-3
Orticole	Dall' ingrossamento del frutto fino a maturazione (2-3 applicazioni)	1-2
Industriali	Fino alla fase di raccolta (4-5 applicazioni)	2-3
Ornamentali	Per tutto il ciclo di crescita	1-2
COLTURE	APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSI kg/ha*
Arboree	A partire dall'allegagione fino a maturazione	5-10
Orticole	A partire dall'allegagione fino a maturazione	4-8
Ornamentali	Per tutto il ciclo di crescita	1-3

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Cristalli solubili

Packaging

1-5-10-25 kg

pH (sol. 6 %)

~4,9

Conducibilità (sol. 10 %)

~ 92,1 dS/m

Avvertenze

Quando usato in miscela con altri prodotti si raccomanda di testare la miscibilità e la compatibilità su un numero limitato di piante, anche per valutare eventuali episodi di sensibilità. Aggiungere acqua al prodotto rispettando il rapporto 4:1 acqua:prodotto. Una volta che il prodotto risulta completamente sciolto, portare a volume desiderato. Si consiglia di non usare in associazione con olii minerali, emulsioni, prodotti a base di calcio o zolfo, e prodotti che abbiano reazione fortemente acida.

Specifiche Tecniche



APPLICAZIONE
FOGLIARE



APPLICAZIONE IN
FERTIRRIGAZIONE



BIOATTIVATORI



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it