

WILDER

FITOFORTIFICANTE

A base di sangue fluido

Apporta azoto organico, carbonio e amminoacidi ad elevata biodisponibilità

Favorisce una crescita vegetativa equilibrata

Svolge un naturale effetto dissuasore nei confronti della fauna selvatica



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

Wilder



Caratteristiche

Wilder è un concime organico azotato fluido ottenuto da sangue idrolizzato termicamente, ricco di azoto organico, carbonio e amminoacidi ad elevata biodisponibilità. Favorisce una crescita vegetativa equilibrata, migliora il colore e la vigoria della pianta, stimola l'attività fotosintetica e sostiene lo sviluppo nei momenti critici del ciclo colturale. La presenza di ferro organico aiuta a prevenire clorosi e carenze nutrizionali, mentre il carbonio supporta la vitalità microbiologica del suolo. Grazie al caratteristico odore della matrice organica, il prodotto esercita un naturale effetto dissuasore nei confronti della fauna selvatica, creando una barriera olfattiva sgradita a ungulati e avifauna. L'impiego regolare contribuisce a ridurre i danni da animali in vigneti, oliveti, frutteti e orticole, soprattutto in aree vicine a boschi o zone ad alta pressione faunistica. Utilizzabile sia per applicazioni nutrizionali fogliari e in fertirrigazione che come trattamento perimetrale.

Composizione

	p/p*	p/v		p/p*	w/v
Azoto (N) totale	4.0%	4.5%	Carbonio (C) organico	4.0%	15.7%
Azoto (N) organico solubile	3.7%	4.2%			

Materie prime: sangue fluido
*Equivalente a p/v a 20 °C.

Dosi e Istruzioni per l'Uso

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSI ml/hl*
Arboree	Durante la fase di ingrossamento del frutto	250-400
Ornamentali	Nei primi stadi di sviluppo	250-400
Orticole	Durante tutto il ciclo vegetativo	250-400
Industriali	Durante tutto il ciclo vegetativo	250-400

COLTURE	APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSI l/ha*
Arboree	Dalla fase di risveglio vegetativo sino a fine ciclo	15-20
Ornamentali	Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo	15-20
Orticole	Da dopo il trapianto e per tutta la fase di crescita	15-20
Industriali	Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo	15-20
Ungulati e volatili	Distribuzione lungo il perimetro agricolo da proteggere	15-20

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Liquido solubile

Packaging

5-10-20-1000 l

Densità (T=20°C)

~ 1125 kg/m³

pH (sol. 6 %)

7

Conducibilità (sol. 10 %)

~ 73,8 dS/m

Avvertenze

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 10° e 30°C, in caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. In caso di miscelazione con altri prodotti, si consiglia di effettuare prove preliminari di miscibilità e compatibilità su un numero limitato di piante. Se utilizzato in miscela con fertilizzanti o prodotti sistemici, si consiglia di ridurre la dose del prodotto ed effettuare una valutazione preventiva degli effetti. L'applicazione in combinazione con prodotti a base di rame può causare problemi.

Specifiche Tecniche



FITOFORTIFICANTE



APPLICAZIONE
FOGLIARE



APPLICAZIONE IN
FERTIRRIGAZIONE



BIO



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it